

M.E.FULDAIN FARMAZIA	ERABILERA-ORRIA	Orria: Ietik 1 Rev.: 0 Data: 02.09.24 M-06.06.04-01.008
-------------------------	-----------------	--

M.E. Fuldain Farmazia
Elkano, 12
20808 GETARIA
943140441 tel.
mirenfuldain@redfarma.org

DISOLUZIOA, AZIDO AZETIKO MEDIZINALA %1,5

Konposizioa:

Medizinal azido azetiko	% 1,5
Eszipienteak	csp 50
Ur destilatua	
Etanola	
Glizerina	

Erabiltzeko modua:

Produktua eman aurretik eskuen artean berotu. Eskuak garbitu. Lehendabizi eskuak garbitu. Ondoren, jarri burua alde batera, minutuko belarria gorantz dagoela. Belarri-gingilari atzerantz eta gora tira leunki, entzunbidea behar bezala irekitzeko. Utzi tantak erortzen eta egin minutu batzuk belarri hori gora begira duzula, botika ondoraino irits dadin. Tantak ez dira kutsatu behar eta, beraz, aplikagailuaren muturrak ez du ezer ukitu behar (ez eta belarri inguruko azalerarik ere). Amaitzeko, garbitu tanta-kontagailua zapi batekin eta itxi ontzia. Tratamenduaren iraupena medikuak agintzen duena izango da. Mina areagotu egiten bada, 10 egun baino gehiago irauten badu edo mina barne-belarrian agertzen bada, medikuarengana joan behar duzu.

Arreta neurriak:

Ez erabili osagaiei alergia izanez gero. Begiak, sudurzuloak edo ahoaren barrualdea ukitutuz gero, garbitu ur ugarirekin. OSO TOXIKOA DA AHOTIK HARTZEN BADA.

Gehiegizko dosifikazioa:

Gorputzaren kanpoaldean soilik erabiltzen denez oso zaila da gehiegizko dosifikazio arazoak gertatzea. Oharkabea edo istripuz ahotik hartuz gero, larrialdietako zerbitzuetara joan (ontzia eraman).

Gordetzeko baldintzak:

Ontzia gorde behar duzu ondo itxita, 25 °C baino tenperatura gutxiagoan eta argitik babestuta.

MEDIKAMENTUAK UMEEN ESKUERATIK URRUN EDUKI BEHAR DIRA!

Egilea: MEF Data: 02.09.24	Berriz aztertu: Data: 02.09.24	Onarpena: MEF Data: 02.09.24
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------